



Osnovni podatki: Vitalni Cimbidijski je verjetno najpomembnejša vrsta orhideje, ki se uporablja za rezano cvetje, med orhidejami. Predvsem iz Tajske prihaja na tisoče popkov na tržnice cvetja. To ni nobeno presenečenje, če pomislimo na trajnost cvetja in seveda na zelo širok spekter barv v katerem najdemo ta rod orhidej.

Cimbidijski bi naj bilo 50 do 60 vrst. Najdemo jih v različnih življenjskih prostorih, v tropskem deževnem pragozdu, kot tudi v razmeroma suhih predelih.

Cimbidijski spadajo med zemeljske orhideje, nekatere pa še vedno živijo na skalah ali celo drevesih.

Njihovo ime izhaja in grščine kymbos = čoln, veže se pa verjetno na zelo zaobljeno ustnico cveta.

Karakteristično za Cimbidijski so debele, mesnate korenine in zelo trpežni dolgi ozki listi, ki običajno rastejo iz ovalno okroglih pseudobulb. Cvetovi se pojavijo na dnu pseudobulbe. Posamezni cvetovi so kot da bi bili napravljeni iz voska podobne substance in so zelo trajni. V prodaji so na voljo hibridi Cimbidijski tako imenovani standardni tipi, ki postanejo zelo veliki in jih štejemo med rastline za hladni rastlinjak. Postavljeni v zimski vrt so neverjeten okras z izredno dolgim časom cvetenja. Za sobne rastline se uporabljajo predvsem spomladi cvetoče sorte, to so predvsem tako zvani mini Cimbidijski. Ti potrebujejo bolj tople rastne razmere kot standardni, zato tudi lažje prenesejo ogrevane prostore. Mini cimbidijski postanejo le kakšen meter visoki in cvetijo od jeseni dalje. Poznamo pa še tako imenovane medium (ali srednje velikosti) Cimbidijski, ki se pa lahko izkažejo ali po številu posameznih cvetov na cvetnem stebelu ali pa po povelikosti posameznega cveta na cvetnem stebelu.

Domovina: Tropska Azija, Avstralija

Temperaturno območje: temperirano do toplo potrebujejo predvsem mini cimbidijski, medtem ko standardni pretežno hladno.

Čas cvetenja: Glede na vrsto in hibrid zelo različno. Pri nas v prodaji, navečkrat najdemo vrste

ki prično cveteti jeseni pa do pozne pomladi.

Barva cvetja: kremno bela, rumena, roza, zelena, rdeča, oranžna, rjava, vijolična

Kraj rasti: celo leto zračno, zelo svetlo in sončno. Standardne cimbidiije in starejše mini cimbidiije lahko od sredine maja do sredine oktobra (ko ni več možnosti padca nočne temperature pod 4 stopinje celzija) postavimo na zelo svetlo ampak ne sončno mesto na prosto, ven.

Temperatura: poleti toplo, po avgustu pa naj bo ponoči občutneje hladneje. Pozimi pa naj bodo temperature za mini cimbidiije do 18-20 stopinj celzija, ponoči pa ne pod 12 stopinj celzija. Za velike standardne cimbidiije pa se lahko nočna temperatura spusti tudi do 8 stopinj celzija. Za vrste ki v tem času pričenjajo cveteti, je pa zaželeno da je nihanje med dnevno in nočno temperaturo čim manjše.



Voda: Od marca do konca avgusta bogato zalivati. V pozni jeseni zmanjšati zalivanje, ker je že hladneje da nebi prišlo do pojava plesni in gnilobe. V kolikor jih imamo v ogrevanem prostoru pri temperaturi 20 stopinj celzija redno zalivamo celo zimo in jih tudi dnevno pršimo. Cimbidiije ki jih imamo pri temperaturi okrog 12-14 stopinj celzija zalivamo skromno. Substrat se naj raje osuši preden zalijemo ponovno.

Gnojenje: Od marca do avgusta redno gnojimo z zelo razredčenim gnojilom vsakih 5 do 7 dni. Vsaki četrti termin gnojenja izpustimo in zalijemo z večjo količino čiste vode. Kadar gnojimo z močnejšo koncentracijo gnojila, gnojimo le enkrat na štiri tedne. Gnojenje pozimi skoraj ni potrebno, morda za tiste ki so izpostavljene višji temperaturi enkrat na štiri tedne z zmanjšano količino gnojila.

Presajanje: vsaki dve leti spomladi, oziroma za tiste vrste ki cvetejo poleti, takoj po cvetenju. Lahko si čas presajanja za večino cimbidijev izenačite tudi s časom, ko jih krati postavite tudi na prosto, saj jim bo povečana zračna vlažnost, ki je spomladi zunaj dosežena, zelo pomagala, da si opomorejo od šoka ki jim ga zada presajanje.

