

<div style="text-align: justify;">

 <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: justify;"> <blockquote>

Cvetni poganjki se pojavijo na različnih mestih na rastlini, odvisno od vrste do vrste. Pri Paphiopedilumu se pojavijo na sredini dveh, eden v drugega preloženih listov.</blockquote> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;">
Pri Vandii in Phalaenopsisu se pojavijo na strani stebra v kotu nekje devetdeset stopinj na kot smeri rasti listov in to običajno da so že vsaj trije listi pred mestom kjer počne poganjek.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;">Pri Dendrobiju se pojavljajo v zgornjem delu rastline prehodnih mestih (vozlih).</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;">Pri Cattley -i in Laeli pa se cvet pojavi na vrhu bulbe.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;">Pri Oncidiju, Odontoglossumu, Coelogyni in Miltoniji pa stransko na bazi bulbe.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;">Pri Miltoniji je poganjek kar nekaj časa skrit v listu, potem pa izgleda kot da poganja iz baze kjer raste list.</div> <div style="text-align: justify;"></div> <div style="text-align: justify;">Pri Cimbidiju pa je na začetku zelo težko razločiti ali gre za poganjek cvetnega stebra ali poganjek novih listov na bazi same bulbe. Če je poganjek malo večji, je v primeru da je bila na začetku vzgoja uspešna, ta bolj okrogel in tako gre to za cvetno steblo.</div>